



ÓRBITA, OCULOPLÁSTICA, CATARATA, ONCOLOGIA OCULAR

14:30 | 16:30 - Sala Lince

Mesa: Filipa Ponces, Nuno Alves, Mara Ferreira

PO100- 15:35/15:40

CIRURGIA PALPEBRAL NO FLOPPY EYELID SYNDROME

Sara Marques, João Luís Silva, Marta Guerra, Rui Tavares

(*Departamento de Oftalmologia do Centro Hospitalar Tondela-Viseu*)

Introdução:

O *floppy eyelid syndrome* (FES) caracteriza-se por laxidão anormal das pálpebras, que se evertem facilmente, condicionando alterações crónicas conjuntivais e corneanas. O tratamento cirúrgico do FES visa a correcção da posição e estabilidade palpebrais.

Materiais e Métodos:

Apresentam-se dois casos de FES, com marcadas queixas sintomáticas e ptose palpebral.

Resultados:

Em ambos os casos foi efetuada reinserção da aponevrose do músculo elevador da pálpebra superior e encurtamento horizontal da pálpebra superior através de ressecção pentagonal da pálpebra superior na sua vertente lateral associada a blefaroplastia palpebral superior. Uma deiscência precoce da sutura palpebral foi resolvida com sucesso, não existindo outras complicações a registar.

Conclusão:

O tratamento cirúrgico efectuado permitiu melhoria da posição, contorno e altura palpebral, assim como melhoria sintomática.