



GLAUCOMA, SUP. OCULAR EXTERNA

14:30 | 16:30 - Sala Delfim

Mesa: Fernando Trancoso Vaz, Miguel Ribeiro, Luís Torrão

PO192- 16:05/16:10

SÍNDROME DE VOGT-KOYANAGI-HARADA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Joana Neves, Mónica Franco, Vanda Nogueira, Luisa Colaço, Sofia Rodrigues

(Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto)

A Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada é uma doença multissistémica rara que atinge órgãos ou tecidos que têm melanócitos, nomeadamente, os olhos, as meninges, o sistema nervoso central, pele, membranas mucosas e ouvido interno. As manifestações oftalmológicas mais frequentes incluem iridociclite, vitrite, edema ou hiperemia do disco ótico, espessamento coroideu e descolamento da retina neuro-sensorial.

Paciente do sexo feminino, com 45 anos de idade, recorre ao serviço de urgência por baixa da acuidade visual e cefaleia occipital. Biomicroscopia ODE sem alterações. Fundoscopia ODE com múltiplos descolamentos serosos. O OCT revelou múltiplos descolamentos de retina bilaterais. Foi diagnosticada Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada e iniciou corticoterapia com melhoria da acuidade visual e resolução dos descolamentos serosos.

O oftalmologista tem um papel importante no diagnóstico e tratamento precoce desta patologia, fundamental para um bom prognóstico visual.