



CATARATA

08:30 | 10:45 SALA PÉGASO

Mesa: José Lemos, João Paulo Macedo, Délio Portela

09:33

CL10- PRECIZON® TÓRICA: AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE VISUAL E ESTABILIDADE ÀS QUATRO SEMANAS E AOS SEIS MESES DE PÓS OPERATÓRIO

Ivo Silva, Miguel Amaro, Eunice Guerra, Ana Ferreira
(Hospital Vila Franca de Xira)

Introdução: O astigmatismo é um erro refractivo com impacto significativo na acuidade visual. 15 a 19% dos doentes com catarata apresentam cilindros superiores a 1,50D.

Actualmente a utilização de LIOs tóricas é cada vez mais frequente, sendo uma alternativa segura e eficaz na correcção de astigmatismos na cirurgia de catarata ou na cirurgia refractiva de *crystalino claro*.

Materiais e métodos: No nosso serviço tem-se vindo a implantar, desde 2012, LIOs tóricas em doentes submetidos a cirurgia de cristalino/catarata, com astigmatismo superior a 1,50-2,00D. Desde 2014 iniciámos o implante da LIO Precizon® Tórica (OPHTEC).

Resultados e conclusões: Apresentam-se os resultados de uma análise retrospectiva de 20 olhos de 20 doentes, onde se comparam acuidades visuais, astigmatismo refractivo e valores de queratometria no pré e pós operatório – um e seis meses, bem como a taxa de rotação de lentes e seu impacto na acuidade visual final.

Ao fim de um ano de utilização da Precizon® Torica, esta parece-nos uma opção segura e eficaz na correcção de astigmatismos em pacientes submetidos a facoemulsificação.