



PO51 - ECTRÓPIO CICATRICIAL

Sara Ribeiro¹, Antonio Augusto Velasco e Cruz²

(¹Hospital Lusíadas Porto, ²Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo)

Introdução: O ectrópio caracteriza-se pela eversão da margem palpebral. Pode afectar a pálpebra superior, inferior ou ambas. O ectrópio cicatricial deve-se ao encurtamento da lamela anterior. Causas importantes incluem trauma, queimaduras, doenças dermatológicas e radioterapia. Complicações pós-operatórias de exérese de tumores palpebrais, blefaroplastia e técnicas de rejuvenescimento facial também podem condicionar este tipo de malposição palpebral.

Material e Métodos: Apresentação de casos clínicos com diferentes causas de ectrópio cicatricial. Discussão das opções terapêuticas disponíveis para correção do ectrópio cicatricial, nomeadamente flap miocutâneo e enxertos.

Resultados: Apresentação das fotos pré e pós operatórias e discussão dos resultados.

Conclusões: Uma correção funcional e estética bem sucedida de ectrópio depende da compreensão de que o ectrópio não é um tipo único de mau posicionamento palpebral mas sim um grupo de condições que podem afectar a porção lateral, central ou medial da pálpebra superior ou inferior, isoladamente ou em combinação. A cirurgia de correção deve abordar os fatores anatómicos subjacentes responsáveis pelo mau posicionamento. É necessário o domínio de várias técnicas cirúrgicas para seleção personalizada e correção adequada deste tipo de deformidade palpebral.