



**CATARATA, Córnea, Cirurgia Implanto-refractiva,
Superfície ocular externa**

08:30 | 10:45 SALA NEPTUNO

Mesa: Walter Rodrigues, João Póvoa, João Feijão

08:46

VD37- FIXAÇÃO DE LENTE INTRAOCULAR SUBLUXADA À CÁPSULA ANTERIOR

Ricardo Leite, Manuel Domingues, Fernando Vaz
(Hospital de Braga)

Introdução: A subluxação de lentes intraoculares de câmara posterior (LIO) é uma possível complicação intra e pós-operatória da técnica da facoemulsificação, com uma incidência estimada entre 0,2 e 3% e está descrita até 25 anos após a cirurgia. Pretende descrever-se a técnica cirúrgica de fixação capsular de reposicionamento de LIO, descrita pela primeira vez em 2012, assim como o desfecho visual e estrutural de uma série de 20 doentes submetidos a esta abordagem cirúrgica.

Material e Métodos: Estudo retrospectivo de uma série de 25 casos, estudando-se a estabilidade da LIO e da sutura prolene 10/00 e a existência de complicações pós-operatórias.

Resultados: Em seguimento mínimo de 6 meses não observamos casos de deslocamento pós-operatório da LIO, mantendo-se a sutura do háptico à cápsula anterior estável e a LIO centrada. Não verificamos perda de acuidade visual.

Conclusão: A fixação capsular é uma técnica eficaz para corrigir subluxação precoce ou tardia da LIO em casos seleccionados.